

»» INFORMATIVO

MANEJO REPRODUTIVO VISANDO 3 PARTOS EM 2 ANOS

Para atingir a meta de três partos em dois anos, o período entre o parto e o próximo acasalamento das matrizes não deverá ultrapassar 90 dias. Para isso, algumas recomendações de manejo reprodutivo devem ser seguidas antes, durante e após o acasalamento. Além disso, um planejamento nutricional adequado é indispensável.

Período pré-acasalamento:

- Fêmeas: 30 dias antes do início do período de acasalamento (PA), selecionar as fêmeas que serão acasaladas, realizar exame clínico geral, avaliar condição corporal (ideal escore 3), fornecer alimentação de boa qualidade.
- Reprodutores: 60 dias antes do início do PA, fazer exame clínico andrológico completo; avaliar condição corporal, fornecer alimento de boa qualidade até o final do PA.

Período de acasalamento:

- Duração média de 45 dias (45 a 52 dias) para cabras e ovelhas.
- Sistema de acasalamento: monta natural, monta controlada ou inseminação artificial. Escolher de acordo com a capacidade técnica do criatório.

Período pós-acasalamento:

- Lactação (30 dias antes do parto até a 4ª semana pós-parto): fornecer alimentação de boa qualidade para obter boa produção de leite e evitar perda de peso das matrizes.
- Desmama: desmamar as crias entre 45 e 52 dias de idade.
- Recuperação do estado fisiológico das matrizes: Fornecer alimentação de boa qualidade para possibilitar a recuperação do estado corporal e o início do próximo acasalamento aos 90 dias pós-parto. O período entre o desmame e o próximo acasalamento não deverá ultrapassar 45 dias.

